Az év madara a böjti része

Élőhely

Szikes síkvidéki mocsárréteken, a nedves réteken, a szikes tavakon, a nyílt vizekkel tarkított és ritkás növényzettel benőtt tocsogókban, a kubikgödrökben és az elöntött mezőgazdasági földeken telepszik meg.

Táplálkozás

Sekély tocsogókon, főleg magokat, zöld növényi részeket és gerincteleneket fogyaszt. Táplálékának jelentős részét teszik ki a különböző rovarok, lárvák, férgek és csigák, de algákat és vízi növények leveleit is fogyasztja.

Elterjedése, állománya, veszélyeztetettsége.



Költőterülete és telelőterülete

Hazai állománya 500-700 pár között ingadozik

© Dr. Gyüre Péter - www.mme.hu

Fészket rakhat nádasban

A fészek jellemzői, fészekalj: 6-13 tojás
Kotlási idő: 22-23 nap

Veszélyeztető tényezők, védelem.

A fészkelőhelyek csökkenése (lecsapolás, kiszáradás, folyószabályozás és csatornázással
a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai, elsősorban a csapadékeloszlás változása,
cserjésedés, legeltetés hiánya.
A költéseket sok esetben meghiúsítják a fészekpredátorok
(róka, borz, vaddisznó, aranysakál, varjúfélék).

Egyéb récefajok közül a leggyakoribb és legismertebb a tőkés réce.



Fokozottan védett hazai faj a cigányréce

Egyik legszebb récefajunk a kanalas réce

A

A Béka-tavaknál is megfigyelhető ritka récefaj a kendemagos réce

Igazi élmény kercerécéket látni.

Üstökös réce- a hazánkban kis számban költő faj egy-egy példánya a Béka-tavakon is megfigyelhető.

A barátréce rendszeresen megfigyelhet - kisebb példányszámban -a Béka tavakon.

Különleges hangja és színei miatt könnyen felismerhető faj.
A Béka tavakon nagy számban telel, nem
ritka a 400-600 példány..

A jeges réce – hazánkban ritkán megfigyelhető faj.

Nyílfarkú réce – néhány példánya minden évben megfigyelhető a Béka tavakon a többi récefaj között.

A Béka-tavakon rendszeresen megfigyelhető a téli hónapokban a bütykös ásólúd.